


Դա կարող է վերաբերել ամենքին



Հեպատիտ B և C...

... ու ՄԷՆՔ



Այս գրքույկը համատեղ աշխատանքի արդյունք է, որ կատարվել է «հասարակական» և «մասնագիտացված» խմբերի կողմից Պրոմեթեյի, Իզերում Հեպատիտների ցանցի համակարգությամբ:

Խորին շնորհակալություն մասնակիցների՝

Abdalouhab, Abdelhakim, Aïcha, Alexandre, Anouch, Elisabeth, Fatima, Fitim, Iulia, Jaspal, Kanga, Lukoki-Lady, Magribe, Marie, Naadire, Narine, Orzhen, Paruire, Pratima, Rudi, Shadi, Shkumbim, Spartak, Taulant, Valon, Wajdi, Yeseda, Zinfira, ...

Աշխատանքային խմբի մասնագիտական կազմին և կազմակերպող կոմիտեին Denise Bezet (IDE, le CATA LPA), Marc Brisson (coordinateur ODPS), Gaëlle Dubruc (coordinatrice COREVIH), D^r Bruno Froissart (HGE libéral), Nathalie Hannhart (psychologue de la prévention, Prométhée), D^r Marie-Noëlle Hilleret (PH, CHU Grenoble), Messaouda Ahdjila-Khellaf (animatrice socio-éducative, CADA le Cèdre), Elhadji M'Baye (sociologue, ORSPERE/Samdarra), Hélène Mollard (assistante, Prométhée), Nathalie Muller (IDE, CHU Grenoble),

Pascal Pourtau (coordinateur, CRIPS), Jonathan Quard (chargé de prévention, AIDES), Saadia Safsaf (IDE, ODTI), Thierry Trilles (coordinateur AIDES) et Simon (élève IDE, ODTI).

Կամավոր և ADATE-ի ու EPU-ի թարգմանիչներին

Nerxhivane Elbasani, Maximilien Pofelski, Jessica Howkins, Fares Gueddah, Achot Akopian, Zrinka Radic, Juliette Lalanne, Vaclav Capek, Karine Maura, Irina Rafaelyan, Paolo Fonti, Angelo Lemma, Tatiana Badin, Battulga Enkhbayar, Rahim Ebrahim, Joanna Pofelski, Abinoan Siqueira, Aurora Tatu, Christina Moreva, Phongsab Montiya, Sercan Genc, Awad Al Suleiman.

Ինչպես նաև խմբերի ղեկավարներին և այն կազմակերպություններին, որոնք մեզ բաց արեցին իրենց դռները:

Adoma, Assfam, CADA le Cèdre, Centre social les Essarts, MJC Abbaye.

AIDES ընկերակցությանը, վերատպագրման համար

Cyril Martin, Nicolas Charpentier, Anita Viossat, Franck Barbier, Muriel Briffault, Grégory Braz.

Coordination : Laurence Lionet/Justine Hornecker/Coralie Horlon

Ինչո՞ւ է պետք խոսել հեպատիտ B և C-ի մասին

Որովհետև դրանք հիվանդություններ են՝



Որոնք նկատելի չեն էջ 6



Որոնք հաճախակի են հանդիպում էջ 8



Որոնք կարող են լինել ծանր էջ 10



Որոնք կարող են փոխանցվել ուրիշին . . . էջ 12



Որոնցից կարելի է խուսափել էջ 12




Որ կարել է բուժել էջ 22



Որ կարելի է ի ախտորոշել էջ 24

Հեպատիտն ի՞նչ բան է

Հեպատիտը լյարդի բորբոքում է



Լյարդը կենսական օրգան է

Այն ծառայում է պահեստավորելու, ձևափոխելու, արտադրելու մասնիկներ, որոնք անհրաժեշտ են մարմնի գործունեության և թունավոր նյութերը վերացնելու համար

Հեպատիտը կարող է առաջանալ թունավորումից
(սպիրտային նյութեր, դեղորայք, սնկեր...) կամ
վիրուսից



Հեպատիտ B և C վիրուսային հեպատիտներ են,
այսինքն՝ հարուցված վարակներից



Հեպատիտ B-ի
վիրուս



Հեպատիտ C-ի
վիրուս

Որո՞նք են հեպատիտ B և C-ի նշանները

Շատ հաճախ նշաններ չեն լինում




Մարդն իրեն հիվանդ չի զգում
Չգիտես, որ հիվանդ ես


Երբեմն վարակի սկզբնական շրջանում կարող է
դեղնություն առաջ գալ, հոգնածություն, սրտխառնոց,
ցավեր ու հոգնածությունը կարող է երկար տևել



Միակ միջոցը իմանալու համար թե կա արդյոք
հեպատիտ B և C ախտորոշումն է



Հեպատիտ B և C - Հաճախա՞կի հիվանդություններ են




Հեպատիտ B և C հաճախակի
հիվանդություններ են

Հեպատիտ B և C ունեցող մարդկանց
մեծամասնությունն այն չգիտե




Աշխարհում ...

3-ից 1-ը շփման մեջ է եղել B կամ C վիրուսի հետ



12-ից 1-ը ունի խրոնիկական հեպատիտ B կամ C





Հեպատիտ **B** ծափն Ի վանդություն է

Աշխարհում ...



10%

Խրոնիկական
հեպատիտ Վիրուսը
մնում և շարունակում է
բազմապատկվել լյարդում



Շփում
վիրուսի հետ



2 միլիարդ

1%

Շանթահար հեպատիտ՝
Վիրուսը ոչնչացնում է
լյարդին



89%

Բուժում՝ Վիրուսը
հեռացված է օրգանիզմից






20-30 տարում նրա բազմացումն առանց բուժման

Ֆիբրոզ



Ֆիբրոզ (20 - 40%)



Քաղցկեղ




1 շաբաթ

80%

Տարեկան 600 000 մահ



Եթե նույնիսկ բուժվել է, պետք է լինել բժշկի հսկողության տակ





Հեպատիտ C ծափնը հիվանդություն է

Աշխարհում ...



Շփում
վիրուսի հետ



20 միլիոն

80%

Խրոնիկական
հեպատիտ Վիրուսը
մնում և շարունակում է
բազմապատկվել լյարդում



Բուժում՝ Վիրուսը
հեռացված է օրգանիզմից

20%





20-30 տարում նրա բազմացումն առանց բուժման



Ֆիբրոզ



Ֆիբրոզ
(20 - 40%)



Քաղցկեղ



Տարեկան 350 000
մահ




Եթե նույնիսկ բուժվել է, պետք է լինել
բժշկի հսկողության տակ





Հեպատիտ B և C-ն ինչպե՞ս են փոխանցվում

Մորից երեխային՝
հղիության ընթացքում



Ինչպե՞ս դրանից խուսափել

Պատվաստում անելով



B Նորածինների, երեխաների, պատանիների և չափահասների համար հեպատիտ B-ի դեմ գոյություն ունի արդյունավետ ու անվտանգ մի պատվաստում:

Երբ պատվաստված ենք հեպատիտ B-ի դեմ դրանով հիվանդանալու կամ այն ուրիշին փոխանցելու ոչ մի ռիսկ չկա:



C Հեպատիտ C-ի դեմ պատվաստում չկա





Երբ մայրն ունի հեպատիտ B ապա նորածնին կատարվում է հատուկ պաշտպանական պատվաստում սերո-պատվաստում



Հեպատիտ C-ի դեմ սերո-պատվաստում չկա, սակայն երեխային փոխանցվելու ռիսկը թույլ է



Որտե՞ղ կատարել պատվաստում:

- Բժշկի մոտ
- Անվճար պատվաստման կենտրոնում





Հեպատիտ **B** և **C**-ն ինչպե՞ս են փոխանցվում



Առանց ապահովիչի (պրեզերվատիվի) վարակված անձի հետ սեռական հարաբերությունների միջոցով՝ սեռական անդամով, սրբանով (հետանցքով), բերանով, տղամարդկանց և կանանց միջև, կամ նույն սեռին պատկանող մարդկանց միջև)



Կենակիցների թվի բազմապատկումը ավելացնում է վարակի ռիսկը



C վիրուսը կարող է փոխանցվել սեռական հարաբերությունների ժամանակ երբ կա հպում արյան հետ (դաշտանի ժամանակ, բաց վերքի կամ վնասվածքի ռիսկ պարունակող սեռական հարաբերությունների առկայության դեպքում)





Օգտագործելով կամ

- տղամարդու արտաքին ապահովիչ (պրեզերվատիվ)



- Կամ կանացի ներքին պրեզերվատիվ



և

- Ձեռնոց ձեռքերով ներթափանցելու համար
- Ատամների պաշտպանական լատեքսե քառակուսի, բերանային սեռական հարաբերության համար
- Քսուկներ, որ սահմանափակում են պրեզերվատիվի պատռվածքի և զսպվածքների ռիսկը



Պրեզերվատիվը և ձեռնոցը փոխել յուրաքանչյուր սեռական պարտնյորի համար.

Եթե օգտագործվում են սեռական առարկաները, ապա դրանք մաքրել և օգտագործել պրեզերվատիվ.



Հեպատիտ **B** և **C**-ն ինչպե՞ս են փոխանցվում

Որոշ երկրներում, կամ Ֆրանսիայում մինչև 1992թ. բուժման ժամանակ՝ արյան փոխներարկման, խոշոր վիրահատության, վերակենդանացման, ոչ ստերիլ գործիքների օգտագործման ժամանակ



Արյան միջոցով



Արյան հետ շփման մեջ գտնվող անհատական օգտագործման առարկաների փոխօգտագործման միջոցով (Օրինակի համար ընտանիքում, անհատական բնակավայրում, բանտում, համավարձակալության դեպքում ...)





Օգտագործելով միանգամյա
օգտագործման առարկաներ



Օգտագործելով անհատական
օգտագործման առարկաներ





Հեպատիտ **B** և **C**-ն ինչպե՞ս են փոխանցվում

Փոխանակելով թմրադեղի գործածման սարքեր՝ սրսկիչ, բամբակ, ֆիլտր, գդալ, ձողիկ, թմրադեղի ծխամորճ ...



Արյան միջոցով



Դաջման (տատուիքովկա) պիրսինգի, սպիացման ժամանակ...արդեն օգտագործված առարկաներով՝ ասեղ, թանաք, զարդեղեն...





Եթե գործածում են
թմրանյութեր, օգտագործելով
նոր և անձնական սարքեր



Գնալով մասնագետի մոտ,
որ գործածում է ստերիլ սարքեր



Հեպատիտ **B** և **C**-ի փոխանցման ռիսկ չկա



շրջանում հեպատիտ
B-ի փոխանցման շատ
թույլ ռիսկ կա խորը համբույրի
միջոցով:



Իսկ եթե կա հեպատիտ **B** կամ **C**

Կան բուժման միջոցներ



Հեպատիտ B- ի համար վերջնական բուժում չկա, այլ կարելի է կասեցնել վիրուսի առաջխաղացումը. Դա թույլ է տալիս նորմալ ձևով ապրել:



Երբ մարդ հիվանդ է կարևոր է՝

- Չդադարեցնել բուժումը նշանակված ժամկետի ընթացքում
- Պարբերաբար հանդիպել բժշկին և կատարել վերաստուգիչ քննություններ
- Այդ մասին խոսել իր շրջապատում և անհրաժեշտության դեպքում դիմել օգնության





Հեպատիտ C-ի համար, օրական 1 կամ 2 հաբ / 8-ից 12 շաբաթվա ընթացքում, բոլորի համար մատչելի, անցանկալի քիչ հետևանքներով, թույլ է տալիս հիմնականում բուժել (Օախսերն ստանձնում է Ֆրանսիայի բժշկական սոցիալական ապահովագրությունը)



Հնարավոր է նոր վարակ




- Սահմանափակել սպիրտային խմիչքների, ծխախոտի գործածումը, խուսափել քաշի չափազանց ավելացումից, որոնք կարող են սրեցնել հիվանդությունը



Ինչպես իմանալ թե արդյոք հիվանդ ենք հեպատիտ **B** և **C**-ով:

Կատարելով ախտորոշում

Դա վիրուսի առկայությունն հայտնաբերող հատուկ բժշկական քննությունն է



Եթե թեստը հայտնաբերում է հեպատիտ, ապա անհրաժեշտ է կատարել արյան անալիզ հաստատելու համար այդ արդյունքը:



Ե՞րբ կատարել հետազոտում

- արյան կամ սեռական սեկրեցների, արտաթորանքի հետ շփման ռիսկից 3 ամիս անց
- Խիստ տեղաճարակ ունեցող երկիր ճանապարհորդելու դեպքում, ծննդաբերություն ուժեղ համաճարակ ունեցող երկրում, բանտում, եթե մոտ ազգականներից մեկը վարակված է հեպատիտով
- Պարբերաբար, եթե ռիսկի է դիմվել կամ եթե կան կասկածներ



Որտե՞ղ կատարել ախտորոշում:

- Բժշկի նշանակմամբ, լաբորատորիայում:
- Առանց դեղատոմսի, տեղեկատվության, հետազոտության և ախտորոշման կենտրոնում
- Որոշ ընկերակցություններում



Հետազոտման բացասական արդյունքը չի պաշտպանում հիվանդությունից: Վիրուսով հնարավոր է վարակվել ավելի ուշ, եթե դիմում են ռիսկի:





Հեպատիտ A:

Հաճախականությունը և ահացությունն աշխարհում



- 1,4 միլիոն դեպք / տարեկան
- 7 000 մահ/տարեկան



Ֆրանսիայում նոր դեպքերի քանակն ավելանում է

Որո՞նք են հեպատիտ A- ի նշանները

Հոգնածություն, ջերմություն, սրտխառնոց,
փորլուծություն, ցավեր, ախորժակի
կորուստ, դեղնախտ...



Որոշ դեպքերում անձնավորությունն իրեն հիվանդ չի զգում,
սակայն վիրուսի փոխանցումը հնարավոր է



Կղկղանքից աղտոտված ջրի կամ
սննդամթերքի սպառմամբ (շփումը բերանի և
արտաթորանքի, կղկղանքի միջև):



Անպաշտպան սեռական
հարաբերություններով,
արտադրությունների առկայության
դեպքում, նույնիսկ շատ փոքր
քանակով և անզեն աչքով աննկատելի.
«Անուլինգուս» կամ «ռիմմինգ», բայց
նաև ֆելացիա (առնանդամի գրգռումը
բերանով) անալ սեռական
հարաբերությունից հետո, արդեն
օգտագործված սեքս պարագաների
կիրառումը...



Ծննդաբերության
ժամանակ, երբ մայրը
վիրուսի կրողն է



Իսկ եթե ունենք հեպատիտ A

Հեպատիտ A- ի համար բուժում չկա

Մի քանի շաբաթում վիրուսը 99%-ով վերացվում է օրգանիզմի կողմից



Հազվադեպ դեպքերում այն կարող է վերաճել լուրջ, ծանր ձևերի՝ շանթարձակ հեպատիտ, որն անհրաժեշտ է դարձնում լյարդի փոխպատվաստումը



Իսկ ապաքինվելուց հետո

Հակամարմինները պաշտպանում են նոր վարակից



Ինչպե՞ս խուսափել դրանից

Պատվաստումը հեպատիտ A- ի վիրուսից պաշտպանվելու լավագույն միջոցն է






Օրական
բազմիցս անգամ
ձեռքերի լվացում



Խմելու
ջրի
սպառում



Հիգիենայի
պահպանումը
ուտելիքի
պատրաստման
ժամանակ



Սեռական հարաբերությունների
ժամանակ պաշտպանվել կանացի
ներքին պրեզերվատիվով
և տղամարդու արտաքին
պրեզերվատիվով, ատամների
պաշտպանական լատեքսե
քառակուսիներով, ձեռնոցներով



Օգտագործվող պարագաները փոխել
յուրաքանչյուր պարտնյորի համար

Եթե օգտագործվում են սեռական առարկաներ
ապա դրանք մաքրել և կիրառել
պրեզերվատիվ



Իսկ վիրուսային մյուս հեպատիտները՝

Դրանք ավելի հազվադեպ են ու ավելի պակաս վտանգավոր
Հնարավոր է միաժամանակ ունենալ բազմաթիվ հեպատիտներ, դա
կավելացնի բարդությունների ռիսկը

Հեպատիտ D

Աշխարհում
հաճախականու
թյան և մահացու
դեպքերը



Վարակվում են հեպատիտ B-ի հետ միաժամանակ
կամ դրանից հետո
D վիրուսը վերածվում է վիրուս B-ի ու բազմանում
Կա 10 միլիոն խրոնիկ հիվանդ

Վիրուսի
փոխանցումը



Զարգացումը



Առողջացում 20%



Խրոնիկական
հեպատիտ 80%




Բուժում



Կանխում





Հեպատիտ E

Տարեկան 20 միլիոն դեպք

Տարեկան 70 000 մահացու դեպք

Խթանախայում շատ հազվադեպ է

Խոզի կամ եղջերուի վարակված մսով
Ոչ մաքուր ջրի և սննդամթերքի միջոցով



Առողջացում 99%



Սրնթաց հեպատիտ 1%





Ո՞ՒՄ ՀԵՏ ԿԱՊԵՎԵԼ

	Տեղեկություն հանձնում	Ախտորոշում
Prométhée Réseau Hépatites ☎ 04.76.24.90.37 St-Martin-d'Hères — GCS MRSI – 16, rue du Tour de l'eau		
Հնդհանուր բժիշկներ կամ այլ մասնագետներ (հեպատոլոգատրոլոգներ)		
AIDES Գտնել հերթապահ կետ և բնակավայրին մոտ գտնվող ախտորոշման կենտրոն www.aides.org		
Cegidd: բնակավայրին մոտ գտնվող ախտորոշման կենտրոն Տեղեկություններ www.sida-info-service.org ☎ 0 800 840 800		 
Hépatites Info Service ☎ 0 800 845 800		
SOS Hépatites ☎ 0 800 004 372		

Պատվաստում

Անվճար
արգանդիչներ
(պրեզերվատիվներ)

ՌԻՍԿԻ
ՆՎԱԾԵՑՄԱՆ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

Բուժում

Ունենալով,
սատարում



